

# Podział permutacji na cykle

- Typ permutacji  $\pi \in S_n$  to wektor  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  gdzie  $\alpha_i$  jest liczbą  $i$ -elementowych cykli w rozkładzie  $\pi$ . Możemy go zapisać jako  $[1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots n^{\alpha_n}]$
- np. dla  $\pi = \{3, 6, 2, 4, 0, 5, 1\}$  mamy:
  - $\pi = (0, 3, 4)(1, 6)(2)(4)$
  - $\pi$  jest typu  $[1^2 2^1 3^1]$

# Podział permutacji na cykle

- $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = c(\pi)$
- $1\alpha_1 + 2\alpha_2 \dots + n\alpha_n = n$
- Liczba permutacji w  $S_n$  typu  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  to
- $$\frac{n!}{1^{a_1} 2^{a_2} \dots n^{a_n} a_1! \dots a_n!}$$
- np. liczba permutacji dla  $3^1 = 3!/3^1 1! = 2$

# Permutacja sprzężona

- Permutacja sprzężona do permutacji  $\pi, \rho \in S_n$  to każda permutacja postaci  $\sigma\pi\sigma^{-1}$ , gdzie  $\sigma \in S_n$
- Permutacje  $\pi, \rho \in S_n$  mają ten sam typ wtedy i tylko wtedy, gdy są sprzężone.

# Transpozycja

- Transpozycja to permutacja w  $S_n$  (dla  $n \leq 2$ ) typu  $[1^{n-2}2^1]$ . Innymi słowy, transpozycja dokonuje tylko jednego przestawienia dwóch elementów ze zbioru  $n$ -elementowego.
- Np. Dla permutacji  $\pi \in S_7$  zadanej jako  $\{0, 1, 5, 3, 4, 2, 6\}$  mamy:
  - $\pi = (0)(1)(25)(3)(4)(6)$
  - $\pi$  ma typ  $[1^5 2^1]$
  - $\pi$  jest transpozycją

# Transpozycja

- Dowolny cykl z  $S_n$  jest złożeniem  $n-1$  transpozycji. Np.  $\pi = \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_0\}$  jest następującym złożeniem transpozycji:  
 $(x_0, x_{n-1})(x_0, x_{n-2}) \dots (x_0, x_2)(x_0, x_1)$
- Np. dla  $\pi = (0,2,5)(1,3,4,6)$ 
  - $(1,3,4,6) = (1,6)(1,4)(1,3)$
  - $(0,2,5) = (0,5)(0,2)$
  - $\pi = (0,5)(0,2)(1,6)(1,4)(1,3) = (1,6)(1,4)(1,3)(0,5)(0,2)$

# Parzystość permutacji

- Permutacja parzysta to permutacja będąca złożeniem parzystej liczby transpozycji.
- Permutacja nieparzysta to permutacja będąca złożeniem nieparzystej liczby transpozycji.
- Znak permutacji  $\pi$  to  $\text{sgn}(\pi) = (-1)^r$ , gdzie  $r$  jest liczbą transpozycji, na które można rozłożyć  $\pi$ .
- $\text{sgn}(\text{id}_X) = 1$
- $\text{sgn}(\sigma\pi) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\pi)$
- $\text{sgn}(\pi) = \text{sgn}(\pi^{-1})$

# Liczby Stirlinga

- Liczba Stirlinga dla cykli  $\left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$  (często nazywana liczbą Stirlinga pierwszego rodzaju) to liczba permutacji zbioru  $n$ -elementowego złożonych z dokładnie  $k$  cykli, czyli takich permutacji  $\pi \in S_n$ , że  $c(\pi) = k$ . Przyjmujemy, że  $\left[ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 1$ , a więc że jest jedna permutacja zbioru pustego bez cykli (funkcja pusta). Przyjmujemy, że  $\left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = 0$  dla  $k < 0$ .
- Permutacje  $Z_4$  złożone z 2 cykli:
  - (012)(3)    (021)(3)    (023)(1)    (032)(1)
  - (013)(2)    (031)(2)    (123)(0)    (132)(0)
  - (01)(23)    (02)(13)    (03)(12)    czyli  $\left[ \begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right] = 11$

# Liczby Stirlinga

$$\left[ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right] = 0 \text{ dla } n > 0$$

$$\left[ \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix} \right] = (n-1)!$$

$$\left[ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right] = \binom{n}{2}$$

$$\left[ \begin{matrix} n \\ n \end{matrix} \right] = 1$$

$$\left[ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] = 0 \text{ dla } k > n$$

$$\sum_{i=0..n} \left[ \begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right] = n! \text{ (liczba permutacji)}$$

$$\sum_{i=0..n} i \left[ \begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right] = n! H_n$$



# Trójkąt Stirlinga dla cykli

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} \quad \text{dla } 0 < k \leq n$$

				1				
				0	1			
			0	1	1			
		0	2	3	1			
	0	6	11	6	1			
0	24	50	35	10	1			
0	120	274	225	85	15	1		

# Liczby Stirlinga dla podziałów

- Liczba Stirlinga dla podziałów  $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$  (często nazywana liczbą Stirlinga drugiego rodzaju) to liczba podziałów zbioru  $n$ -elementowego na dokładnie  $k$  bloki (parami rozłączne podzbiory). Znow przyjmujemy, że  $\left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right\} = 1$  oraz  $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = 0$  dla  $k < 0$ .
- Permutacje  $Z_4$  złożone z 2 bloków:
  - $\{012\}\{3\}$        $\{023\}\{1\}$
  - $\{013\}\{2\}$        $\{123\}\{0\}$
  - $\{01\}\{23\}$        $\{02\}\{13\}$        $\{03\}\{12\}$       czyli  $\left\{ \begin{matrix} 4 \\ 2 \end{matrix} \right\} = 7$

# Liczby Stirlinga

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\} = 0 \text{ dla } n > 0$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix} \right\} = 1 \text{ dla } n > 0$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1 \text{ dla } n > 0$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ n \end{matrix} \right\} = 1$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{2}$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \leq \left[ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right]$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = 0 \text{ dla } k > n$$

# Trójkąt Stirlinga dla podziałów

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\} \quad \text{dla } 0 < k \leq n$$

				1				
				0	1			
			0	1	1			
		0	1	3	1			
	0	1	7	6	1			
	0	1	15	25	10	1		
0	1	31	90	65	15	1		

Dla skończonych zbiorów  $X, Y$  liczba surjekcji

$$X \rightarrow Y \text{ wynosi: } |Y|! \binom{|X|}{|Y|}$$

# Liczba Bella

- to liczba podziałów zbioru n-elementowego, czyli:

$$B_n = \sum_{i=0..n} \left\{ \begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right\}$$

- Kolejne liczby Bella (od n=0):
  - 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975

$$B_{n+1} = \sum_{i=0..n} \binom{n}{i} B_i$$